


Contenido neto:

MX000115



**BIO FINGERLING**  
**10 KG NT**  
**1.5MM**

Alimento balanceado medicado con Oxitetraciclina para Camarón

Autorización SAGARPA A-136/2016-002

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	35.0%	Trigo, maíz, sorgo, harina de pescado, harina de calamar, pastas de oleaginosas, subproductos de trigo, gluten de maíz, gluten de trigo, aceite de pescado, aceite vegetal, lecitina, fosfato de calcio, carbonato de calcio, cloruro de colina, metionina, lisina, vitamina C, vitaminas A y D estabilizadas, vitaminas E y K, tiamina, niacina, riboflavina, biotina, piridoxina, pantotenato de calcio, sulfato de cobre, óxido de magnesio, óxido de manganeso, yodo, óxido de zinc, sulfato ferroso sulfato de potasio, medicación: (oxitetraciclina 4000 g/Ton). ESPECIE(S) DESTINO: Camarón ( <i>Litopenaeus vannamei</i> ). Etapa engorda inicial
Grasa, mín.	6.0%	
Humedad, máx.	11.0%	
Fibra, máx.	4.0%	
Cenizas, máx.	11.0%	
E.L.N.	33.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con oxitetraciclina, antibiótico de amplio espectro y efecto bactericida para el tratamiento de los siguientes géneros bacterianos, que afectan al camarón: <i>Rickettsia</i> spp (Hepatopancreatitis necrotizante, NHP), <i>Vibrio</i> spp, <i>Pseudomonas</i> spp., <i>Aeromonas</i> spp. Diseñado para ser suministrado a los camarones en la fase inicial de crecimiento una vez sembrados en los estanques de engorda, por un periodo aproximado de 28 días o desde que los camarones hayan alcanzado entre 2.5 g de peso y hasta que adquieran la talla de aproximadamente 5 g de peso. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: El suministro de alimento es calculado en base al 20 % de la biomasa obtenida y dividido entre el número de veces que se requiera servir de acuerdo al manejo de cada granja. Se administra durante un periodo de 7 a 14 días consecutivos. ADVERTENCIAS: No almacene este alimento en lugares húmedos, mal ventilados o calientes. Colóquelo en sitios secos y al abrigo de la luz solar directa, de roedores, insectos y otros animales nocivos al alimento. Estébelo sobre tarimas o polines y nunca sobre el suelo directo para evitar que absorba humedad. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase animales. Dé salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento. Retirar este alimento 30 días previos a la cosecha de los camarones destinados al consumo humano.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

**BIO FINGERLING**  
**10 KG NT**  
**1.5MM**

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



FECHA DE PRODUCCION