# MX000393

# ABABE PLUS MALTA MONENSINA 40KG PF

Alimento balanceado medicado con monensina para becerras y becerros

### Autorización SAGARPA A-0544-139

Análisis garantizado Proteina, min. Grasa, mín. 2.0%

8.0%

Fibra, máx, 8.0% Cenizas, máx. 50.0%

E.L.N., mín.

Ingredientes Maíz o sorgo o trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos

de cereales, subproductos lácteos de origen bovinos, harina de pescado melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, fosfato de calcio cforuro de sodio, minerales traza (iodo, hierro, magnesio, manganeso Humedad, máx. 12.0% cobalto, cobre, zinc, cromo y selenio quelatados), vitaminas (A, D, E, K tiamina, riboflavina, niacina y cianocobalamina), levaduras viables deshidratadas Saccaromyces cerevisiae boulardii (1 billón UFC/kg.) saborizante frutal artificial, ácido propiónico y acético como fungicida monensina sódica 30g/t

## ndicaciones de uso

Alimento balanceado medicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la monensina sódica para becerras y becerros. Se deben suministrar forrajes de calidad v apetecibles que aportan la fibra necesaria para una buena digestión. hútil cualquier programa de alimentación o sanitario si las crias no reciben calostro durante tas primeras 8 horas de vida. Mantener en todo momento aqua limpia y fresca para las becerras.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Oral, Empiece a suministrarto desde fos 5 días de edad en pequeñas cantidades de 10 a 12 gramos adicionales al día, aparte de su ración diaria de leche mas agua. Los primeros días coloque en la boca del animal unos cuantos comprimidos frescos (no sobrantes del pesebre) hasta que se acostumbre a comerio. A la 4º o 5º semana de edad su consumo deberá haber aumentado hasta 500 grdía aproximadamente y a la 6º o 7º semana en unos 800 g/día. De la 7ª semana en adelante su consumo debe ser gradualmente mayor, hasta que a los 4 meses este comiendo de 2 a 3 kg/día. Desde la 8ª semana de edad, debe proporcionar forrajes secos de leguminosas (affalfa o trébol) de buena calidad y forrajes húmedos hasta fos 6 meses. Para más recomendaciones de uso, favor de contactar con el servicio técnico de maltaCleyton®

# ADVERTENCIAS:

Ofrezca el alimento diariamente y no permita que consuman del día anterior o en mal estado No almacenar el alimento en lugares húmedos , mal ventilados, o calientes. Colóquelo en sitios secos y al abrigo de la luz solar directa de roedores, insectos, y otros animales nocivos al alimento. Estíbelo sobre tarimas o polines y nunca directamente sobre el suelo para evitar que absorba humedad. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase de animales. De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento

Suspender el consumo 3 días antes del sacrificio de animates para consumo humano. No se administre a Equinos.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

FECHA DE PRODUCCION

