"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

VIPREWEAN FASE 3 F TILOSINA Y FLORFENICOL 40KG PE Contenido Neto: 40kg

ALIMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLORFENICOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN \$00-8806-A A98ADA2 noisezitotuA

USO VETERINARIO

OUASITNARAÐ SISIJANA

%09°\$9	DIE.	N'T'3
%05'Z	.xelvi	sezjuag
%00'ZI	XEA.	рерэшпн
9/09/8	Wax.	Fibra cruda
%05'E	'uliM	Grass cruda
%00'6T	MIN	Sbura enistor9

INCKEDIENTES:

clanocobalamina. vitemines A, D3, E, X, biotine, niecine, pantoteneto de ceicio, mononitrato de tiemine, riboflavine, écido fólico, cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, iodo EDDY y/o yoduro de potasio, inhibidor de hangas,tilasine (110 g/tan), florfenical (40 g/tan), carboneta y/o sulfeta ferrosa, sulfeto de sabovizante sintético sabor frambuess, antioxidante (BHA Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propionico como combinación de Bacillus licheniformis y B Subtilis (9.9 x10/8) UFC/kg), cloruto de colina, litesa (2 000 FYT/kg), ilstna y/o metionina y/o treonina y/o tripitófano, cuitivo de levadura Saccharomyces cerevisíae inactiva, harina de sangre de origen porcino, exúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodicálcico, sal común, bentonita 201go, maiz, pasta de soya, suero de feche y/o factosa de origen bovino, aceite vegetal, harina de pescado y/o

INDICACIONES:

conformer en antener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos anizado para el tretamiento de infecciones es es estátanes es la combineción de florfenicol y tilosíne. Alimento medicado con tilosina y fiortenicol para cerdos en la etapa de preiniciación (de IZ a 15 kg de peso).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Orsi, ofrecer el sitniento VIPAEVVEAN FASE 3 a libre acceso bajo la primicia de poco y trecuente durante

seib 7 A 2

ADVERTENCIAS:

protegidos de roedores, insectos y otros enimales. स्व almacenar el allmento en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sittos secos y frescos,

of se administre este producto 28 dias entes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo Estibaκ sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootácnica de los porcinos.

Su venta requiere receta médica

o meses después de su fecha de producción Fecha de caducidad: : oM stol