MX012173



GROWPIG! DESARROLLO DRFENICOL 40KG PE

Alimento balanceado medicado con florfenicol para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garan	tizado
Proteína, min.	15.0%
Grasa, mín.	4.0%
Humedad, máx	C.12.0%
Fibra, máx.	3.0%
Cenizas, máx.	6.0%
E.L.N.	60.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, oxido y/o sulfato de manganeso sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t)., saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xilanasa 1200 U/kg., ß glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), florfenical (40 g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con florfenicol, formulado y elaborado con proteínas. granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg.). Indicado su uso de 7-15 días para el tratamiento de afecciones respiratorias simples y complejas. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: No administre este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano

No consumir derivados animales durante 5 días posteriores al tratamiento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO FLORFENICOL 40KG PE

