

MX000206

Contenido neto:



CRECIPORK MEJORADO

API ABA FEBENDAZOL

40KG PE

Alimento balanceado medicado con Fenbendazol para Cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-497

| Análisis garantizado | | Ingredientes |
|----------------------|-------|--|
| Proteína, mín. | 15.5% | Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, ácido fólico, biotina, cianocobalamina), cloruro de colina, aminoácidos, (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xilanas 1200 U/kg., β -glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg.), Fenbendazol (6 g/t). |
| Grasa, mín. | 2.5% | |
| Humedad, máx. | 12.0% | |
| Fibra, máx. | 7.0% | |
| Cenizas, máx. | 9.0% | |
| E.L.N. | 54.0% | |

| Indicaciones de uso |
|---|
| Alimento balanceado medicado con Fenbendazol (uso continuo) para cerdos de 35 a 70 kg de peso. Fenbendazol está indicado como desparasitante de amplio espectro y alta efectividad contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y renales (en todas sus fases evolutivas) que afectan al ganado porcino, bajo la prescripción y supervisión del médico veterinario. De 20 kg a 35 kg de peso vivo, utilizar alimento INICIAPORK MEJORADO. Mantenga en todo momento agua potable y fresca para los cerdos. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Proporcionar a libre acceso. Oral. ADVERTENCIAS: No utilizar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Evite la contaminación del alimento. Estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes. |

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CRECIPORK MEJORADO
API ABA FEBENDAZOL
40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



D17 FECHA DE PRODUCCION