

MX010725



CARNERINA API ABA FASE 2

40KG LINCOMICINA

CLORTETRACICLINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para crecimiento de cerdos.

**Autorización SAGARPA A-0544-504**

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 16.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanas 1200 U/kg, $\beta$ glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante frutal sintético, lincomicina (100 g/t), clortetraciclina (400g/t).
Grasa, mín. 3.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 5.0%	
Cenizas, máx. 8.0%	
E.L.N. 56.0%	

Indicaciones de uso
<p>Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad)</p> <p>Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.</p> <p>Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por <i>Mycoplasma</i> spp y <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (App); y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas Porcinas (EPP)</p> <p>Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.</p> <p>DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.</p> <p>ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.</p> <p>Tiempo de retiro: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.</p>

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 2

40KG LINCOMICINA

CLORTETRACICLINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

