)30 FECHA DE PRODUCCION

52KG bE

destete (21 dias de edad) Alimento balanceado preiniciador medicado con amoxicilina para lechones antes del

NUMERO DE AUTORIZACIÓN A-0544-682

terbidzeb onion		
selo eb asizaq	, sobaseoon	id sələ
setneibertes	1	

opiónco), 15X Premium 1 kg/t. sonina, triptôfano, valina), acidificantes (ácido cítrico, fórmico y balto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, cromo gánico, selenio orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, saminas del complejo B, cloruro de colina, aminosocidos (lisina, metonina, saminas del complejo B, cloruro de colina, aminosocidos (lisina, metonina, nisto de manganeso, sultato de cobre, óxido o sultato de zinc, sultato de extrase, cerboneta de calcio, fosfeta de calcio, ctarura de sodio, áxido o celte vegetal, suero de leche deshidratado o lactosa de origen bovino, ер вредиеско 'opeosad op euwey 'opeje edicional, relación profesione suos de ceres

OUPIGI BABY AMOXICILINA

1500 U/kg., glucanasa: 200 U/kg.	7-71-4	
propionco), 15X Premium 1 kg/l., (Macieste cordate y Magnolie off	%0.18	.nim ,.N.J.∃
treonina, triptôfano, valina), acidif	%G:9	Cenizas, máx.
	%9.2	Fibra, máx.
sulisto de manganeso, sulfato de cobalta, carboneto o sulfato ferros	45.0%	Humedad, máx.
aceite vegetal, suero de fache des dextrosa, carbonato de calcio, fos	%9°L	Grasa, min.
Concentrada de soya, plasma por	%9:07	Proteina, min.
u	Análisis Garantizado	

Seborizante y aromatizante lácteo frutal sintéticos, amoxicilina 400 g/t.

judicaciones de uso

Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, de cereales procesados, fuenies de vitaminas y minerales, que proporcionan los nutrimentos esenciales para la transfición al destete. θ este campio entranço hopieimes qibestivos. Este torumtado λ elaborado con broteinas, disuos escenagamente en la elabora de campio de elimento lidinido e solido λ tener mus inelior escablación. (\$1 giss de edad) en presentación de minipellet que ayuda al lechón a consumirlo Alimento balanceado preiniciador medicado con amoxicilina para lechones antes del destate

vades veces al die pare estimular el consumo del alimento, evitando le contaminación y el desperdicio reproductivo. Proporcionar consumo a voluntad en pequeñas cantidades pleuroneumonía contagiosa, poliserositis infecciosa, netritis, cistitis, e infecciones del tracto

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdifos. del alimento. Retirar el alimento contaminado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN. A libre secesso via oral. Durante 7 días Cuando los lechones cumplan 21 días de adad, sustituya padatenente este alimento por

ADVERTENCIAS: No simacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mai vantillados, hágalo en Bajo prescripción y supervisión de médico veterinado.

en contacto con paredes. No usar para alimentar animales rumiantes De preferencis, estibar sobre tarimas y no dejar el slimento directamente sobre el suelo y/o

No administre este producto a bovinos en producción de leche destinada a consumo humano cueumy oursuos e opeugsep Tiempo de retiro: 14 días. No administre este producto en aves de producción de huevo

po se administre a equinos destinados para el consumo humano.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

52KG bE YOUPIG! BABY AMOXICILINA

YOUPIG! 1