

MX010726



CARNERINA API ABA FASE 2

40KG TILOSINA SULFAMETAZINA

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilosina y sulfametazina para crecimiento de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-504

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 16.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico vitaminas A, D, E y K estabilizadas vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), ácido propiónico y ácido acético como fungicida enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg., xilanasas: 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante frutal o aromatizante frutal sintético, fosfato de tilosina (110 g/ton), sulfametazina (110 g/ton).
Grasa, mín. 3.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 5.0%	
Cenizas, máx. 8.0%	
E.L.N. 56.0%	

Indicaciones de uso
<p>Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad). Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente.</p> <p>Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa.</p> <p>Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por Bordetella bronchiseptica; para la prevención de la disentería porcina enteritis bacteriana porcina (salmonelosis) o enteritis necrótica causada por salmonella choleraesuis; control de neumonía porcina causada por pasteurella multocida y/o Actinomyces pyogenes.</p> <p>Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.</p> <p>DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.</p> <p>ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.</p> <p>Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.</p>

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 2
40KG TILOSINA SULFAMETAZINA
CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

