MX012046



CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA SULFACLOROPIRIDACINA Y TRIMETOPRIM 40KG PE

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina sódica y trimetoprim para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado
Proteína, mín. 13.0%
Grasa, mín. 4.0%
Humedad, máx. 12.0%
Fibra, máx. 7.0%
Cenizas, máx. 10.0%

54.0%

E.L.N.

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, ôvido a sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óvido o sulfato de zinc, sulfato de cobalo, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio a EDDI, selenito orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, fracionina, tratoforano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10°9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg.) o xilanasa 1260 U/kg.) glucianasa 200 U/kg. cultasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg), sulfacloropiridacina sódica (500 g/t), trimetoprim (100 g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina y trimetoprim para cerdas en gestación Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas , granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado su uso de 5 a 10 días para el control de rinitis atrófica, complejo MMA, diarreas bacterianas bronconeumonías, neumonía enzootica, enterotoxemia y colibacilosis. Mantener en todo momento aqua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral. Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y maí ventiliados hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: 3 días previos al sacrificio destinado a consumo humano.

No administrar en aves de postura.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"