

MX010747



# CARNERINA API ABA FASE 4 40KG CLORTETRACICLINA TIAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para cerdas lactantes

Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 17.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2x10 <sup>9</sup> UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanas: 1200 U/kg, $\beta$ glucanasa: 200 U/kg, celulasas: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg) clorhidrato de clortetraciclina (300 g/ton), fumarato hidrogenado de tiamulina (100 g/ton).
Grasa, mín. 6.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 6.0%	
Cenizas, máx. 10.0%	
E.L.N. 49.0%	

Indicaciones de uso
<p>Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina para cerdas en lactancia. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas.</p> <p>Indicado su uso 7 días para la prevención y tratamientos de problemas respiratorios (neumonía enzootica, pleuroneumonía, rinitis atrófica, enfermedad de Glasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea, post-detele, enteritis no específica, enteritis necrótica) problemas reproductivos (leptospirosis).</p> <p>Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.</p> <p><b>DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:</b> La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales y del número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.</p> <p><b>ADVERTENCIAS:</b></p> <p>Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.</p> <p>De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.</p> <p>Tiempo de retiro: No debe de administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.</p>

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

## CARNERINA API ABA FASE 4 40KG CLORTETRACICLINA TIAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

