MX012042



CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA FOSFATO DE TILMICOSINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilmicosina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado Proteína, mín. 13.0% Grasa, mín. 4.0% Humedad. máx. 12.0%

Fibra, máx. 7.0%

Cenizas, máx. 10.0% E.L.N. 54.0%

2.2.71. 04.070

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de cobre, óxido o sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobaño, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cforuro de cofina, aminoácidos (fisina, metionina, freonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10°9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg. o xilanasa 1200 U/kg.), fosfato de tilmicosina (200 g/ton)

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con tilmicosina para cerdas en gestación

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas , granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que

proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado para el tratamiento de neumonía causada por Actinobacillos pleuropneumoniae

Mycoplasma hyopneumoniae. Pasteurella multocida y otros microorganismos sensibles a timicosina; en enfermedad de Glasser; y para reducir los signos clínicos y mortalidad asociada al Síndrome Respiratorio: y Reproductivo Porcino (PRSS)

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/d/a. Oral.

Tratar de ofrecerto en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiampo de retiro: Este alimento deberá de ser retirado de los cerdos destinados para consumo humano 7 días antes del sacrificio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA FOSFATO DE TILMICOSINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

FECHA DE PRODUCCION