

MX010739



CARNERINA API ABA FASE 4

40KG AMOXICILINA

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con amoxicilina para cerdas lactantes.

Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	17.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2x10 ⁹ UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, β glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), amoxicilina (400 g/ton)
Grasa, mín.	6.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	6.0%	
Cenizas, máx.	10.0%	
E.L.N.	49.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con amoxicilina para cerdas en lactancia. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas. Indicado su uso 7 días para el tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, pleuroneumonía contagiosa, poliserositis infecciosa, nefritis, cistitis e infecciones del tracto reproductivo. Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales, y de número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.
De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.
Tiempo de retiro: 14 días. No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 14 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 4

40KG AMOXICILINA

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

