

MX010756



CARNERINA API ABA FASE 5

40KG LINCOMICINA CLORTETRACICLINA

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina base para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 13.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2×10^9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xilanasa 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), lincomicina (100 g/t), clortetraciclina (400 g/t).
Grasa, mín. 4.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 7.0%	
Cenizas, máx. 10.0%	
E.L.N. 54.0%	

Indicaciones de uso
<p>Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para cerdas en gestación. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.</p> <p>Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por <i>Mycoplasma</i> spp y <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> (App), y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas Porcinas (EPP). Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.</p>

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 5

40KG LINCOMICINA CLORTETRACICLINA

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

