MX010685



GROWPIG! DESARROLLO 40KG FLORFENICOL TILOSINA AMBROXOL CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado
Proteína, mín. 15.0%
Grasa, mín. 4.0%
Humedad, máx. 12.0%
Fibra, máx. 3.0%
Cenizas, máx. 6.0%
E.L.N. 60.0%

Ingradientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, oxido y/o sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de cobre, oxido y/o sulfato de cobre, oxido y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo organico, selanio organico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de cofina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), atuminosilicatos como secuestrante de micotoxinas 3 kg/t, saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acetico como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, g glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), florfenicol (40g/t), tartrato de tilosina (110 g/t), clorhidrato de ambroxof (4g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con florfenicol, itiosina y ambroxol, formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los mutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 5 by 75 kg). Indicado su uso de 10 a 15 días para la prevención y tratamiento del complejo respiratorio porcino, y otras infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y de la piel, colibacidosis e ideits proferativa.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro. No utilizar este producto 13 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO 40KG FLORFENICOL TILOSINA AMBROXOL CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"