

MX012170

Contenido neto:



GROWPIG! DESARROLLO SULFACLOROPIRIDACINA Y TRIMETOPRIM 40KG PE

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina sódica y trimetoprim para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 15.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido y/o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xilanas 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), sulfacloropiridacina sódica (500 g/t), trimetoprim (100 g/t).
Grasa, mín. 4.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 3.0%	
Cenizas, máx. 6.0%	
E.L.N. 60.0%	

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con sulfacloropiridacina y trimetoprim; formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg.).

Indicado su uso de 5 a 10 días para el control de rinitis atrófica, diarreas bacterianas, bronconeumonías, neumonía enzoótica, enterotoxemia y colibacilosis.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: 3 días previos al sacrificio destinado a consumo humano. No administrar en aves de postura.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO SULFACLOROPIRIDACINA Y TRIMETOPRIM 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



D92 FECHA DE PRODUCCION