Contenido Neto: 25kg

RATTTOXIA

MEAN UP 0 A

AUINDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA Autorización SAGARPA A-9066-145

PARA PORCÍNOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

%00'8 cenizas View. ASSX. %00'ZT рерэшпн %00'Z Fibra cruda XEN. 'uii/\ %00'9 Grass Cruda WILL. 9600'87 Proteina cruda

OUASITMANAD SISIJAMA

INGREDIENTES: %00'65 N'T'

Fecha de caducidad:

Lote No:

collist able catualizativ categoris of association and attendance categorie cultated N T TO A
óxido y/o sufiato de zinc, sufiato de manganeso, selenito de sodio, EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas
(BHA, Etoxiquin), tiamutina (100 g/t), ciortetraciclina (300 g/t), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre,
sabor frambuesa, adulcorante, ácidos orgánicos, extractos vegetales (cúrcuma, alllum, capsicum), antioxidante
y/o triptofano y/o gluternina y/o valine, fitasa (2,000 PYT/kg), cioruro de colina, betaina, saborizante sintético
y/o bovino, carbonato de calcio, ortosfato monodicálcico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina
proteins concetrada de soya, harina de pescado, pissma porcino y/o harina de sangre de origen porcino
Sorgo, maiz, pasta de soya, soya integral, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal,

Alimento medicado con damulina y ciortetracicina para cerdos en la etapa de preiniciación (del 12° dia de vida y INDICACIONES: cianocobalamina.

You's et at morriss' users of bastorener, be calculationed as the morrishes defined and the contraction of t

sasceptibles a la combinación de tiamulina y ciortetraciclina. hasta que alcance los 5,0 kg de peso), halicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: importante mantener en todo momento agua limpia y tresca para los porcinos.

ADVERTENCIAS: Oral, ofrecer et afimento WEAN UP 0 A a libre acceso bajo is primitis de poco y frecuente durante 7 días.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar al producto directamente sobre al sualo y/o en contacto con paredas. protegidos de roedores, insectos y otros animales. No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mal ventillados, hágalo en sitios secos y frescos.

No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

e meses después de su fecha de producción

Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

No se administre este producto 7 dias antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano.

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"