"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

Fecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción

Su venta requiere receta médica

No ofrecer el silmento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

Processor se records, man de la limente directamente sobre el suelo ylo en contacto con paredes. Re se administre este producto 28 días afet del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo

No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sittos secos y frescos, protegidos de roedores, insectos y otros animales.

ADVERTENCIAS:

: oM stol

Oral, offecer el alinnento MPREWEAR PASE 1 a libre acceso bajo la primista de poco y frecuente durante. S.A.7 dias.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Alimento medicado con allosina y florfenicol para cerdos en la etapa de preintiación (de 6,0 a 8,0 kg de paso). Indicado para el tretamiento de infeccionas sensibies a la combinación de florfenicol y tilosína. Importiarte mantener en todo nromento agua limpia y fresca para los porcinos

INDICACIONES:

Songo, maix, pasta de soya, suero de leche y/o lacitosa de origen borho, acetie vegetal, porteina concentuada de soya, harina de precado, plasme portino y/o harina de sangra de origen portino, asúces, centorado de calcio, orrófosa los monodicalictos, sal común, listina y/o menta y/o tropical propriadano y/o giustamina y/o ad-cido giustamico, cultivo de levadura Saccheromycas cerevisiaes inactivas, combinación de Bacillus lichaniformis y p. 5. dustille (9.9 x 10°8 BFC/kg), cioruzo de colina, fitasa (2.000 FFT/kg), sabovizante ainretico sabor frambusesa, amboxidante (8Ha). Estoxiquin), acidos orgánicos, acido propiónico como inhibidor de inorgos, tilosine(110 g/ton), floriente (4.00 g/ton), candonario y/o sulfato de color, oxido y/o sulfato de color, disconso inhibidor de inorgos, tilosine(110 g/ton), floriente (4.00 g/ton), candonario y/o sulfato de color, oxido y/o sulfato de color, oxido y/o sulfato de sino, cultado de calcio, mononitrato de stato de partezio, viseminas A. D3, E. K. ibidina, niecina partotenato de calcio, mononitrato de stamina, riboritavina, ácido fólico, cianocobalamina.

INCKEDIENTES:

%00'75	DIE.	N'7'3
%00'8	.xsM	SezineO
%00'ZI	XEW.	рерэшпн
%00'E	Wax.	Fibra cruda
%05'b	'uliM	Grass cruda
%05'07	Min	Proteína cruda

ODAZITNAAAA SISIJANA

USO VETERINARIO

AUMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLOREFUNCOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

VIPREWEAN FASE 1 F TILOSINA Y FLORFENICOL 25KG PE

NIBBEWEVN EVZE 1 E 111 OZINV Λ EL OBEENICOL 3 ZKG DE
CONTENIO NEGO: 22kg