Contenido Neto: 40kg

St/000XM

VIPREWEAN FASE 2 F TILOSINA Y FLORFENICOL 40KG PE

ALIMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLORFENICOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACION E00-3309-A A9AADA2 noissairo3uA

USO VETERINARIO

36°20% OGASITNARAÐ SISIJANA

N'7'3	DIF.	%05'85
SezineO	.xeNi	%05'L
рерэшпн	Ye'V	%00'ZI
Fibra cruda	ABX.	%00'E
Grass cruda	Will.	%05'b
20003 5000100	15.55160	BCOP'CT

INCREDIENTES:

INDICACIONES:

K, biotina, niacine, pentoteneto de ceicio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cienocobalamina. y/o suffato de zinc, suffato de manganeso, sefenito de sodio, iodo EODY y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, hongos, tilosina (110 g/ton), florfenicol (40 g/ton), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), écidos orgánicos, ácido propionico como inhibidor de de Bacillus licheniformis y B Subtilis (9,9 x 10/8) UFC/kg), doruro de coline, litesa (2 000 FYT/kg), seborizante y/o mettorina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura Saccharomyces cerevistae inactiva, combinación perina de sengre de origen porcino, ezúcar, carboneto de ceicio, ortofosfeto monodicéicico, sal común, lísina posão: majo: basta de sova: anero de jeche y/o jactosa de origen bovino, aceite regetal, harina de pescado y/o

sonfores es an antener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos indicado para el tretamiento de infecciones sensibles a la combineción de flortenicol y tillosine. Alimento medicado con filosina y fiortenicol para cerdos en la etapa de preiniciación (de 8 a 12 kg de peso).

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el altimento VIRREWEAN EASE & a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante

.aeib T A 2

ADVERTENCIAS:

protegidos de roedores, insectos y otros enimeies. No almacenar el allmento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y frescos.

omusnos de este producto 28 dias antes del sacrificio de los cerdos que se desfinan para el consumo Estibar sobre tatimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

ya ofrecer el allmento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica

Fecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción : oM stol

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"