MX012071



CAPORINA CRECIMIENTO API ABA ROBENIDINA 40KG M2

Alimento balanceado medicado con Robenidina para pollos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-613

Análisis Garantizado

Proteina, min. 19.0% Grasa, min. 3.5%

Humedad, máx. 12.0%

Fibra, máx. 3.0%

Cenizas, máx. 7.0% E.L.N. 55.5%

Ingredientes

Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10^a9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina,

colina, minerales orgánicos (lodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo # 5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, 8 quicanasa: 200

Ü/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 Ü/kg), carotenoides naturales. Robenidina 33 g/t.

Indicaciones de uso

Nimento balanceado medicado para pollos de engorda desde el día 22 hasta los 35 días de edad. APORINA CRECIMIENTO es un alimento completo, medicado con Roberidina. Contiene 9% de proteira y fuertes naturales de pigmento.

xantofilas y carotencides). Proporcionar a partir de los 22 a los 35 días de edad en zonas con ilimentación restringida y periodos de engorda mayor a 49 días; y de los 22 hasta los 28 días en irogramas de alimentación a libre acceso (en zonas con ciclos menores a 42 días).

Está indicado en el tratamiento de la coccidiosis aviar. Al día 36 de edad sustituya este alimento por CAPORINA FINALIZADOR, suministre agua limpia y

ilimento a libertad.

OSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Vía oral. A libre acceso a partir de los 22 a los 35 días de edad.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en aves de postura, productora de huevo para plato destinado para consumo humano.

lo almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y inclegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con varedes

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



7

CAPORINA CRECIMIENTO API ABA ROBENIDINA 40KG M2