

MX012043



# CARNERINA NO. 5 GESTACION

## API ABA OXITETRACICLINA

### 40KG PE

Alimento balanceado medicado con oxitetraciclina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

| Análisis garantizado |       | Ingredientes  |
|----------------------|-------|---|
| Proteína, mín.       | 13.0% | Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ( $2 \times 10^9$ UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., xilanasa 1200 U/kg., $\beta$ glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), oxitetraciclina (400 g/ton.). |
| Grasa, mín.          | 4.0%  |   |
| Humedad, máx.        | 12.0% |   |
| Fibra, máx.          | 7.0%  |   |
| Cenizas, máx.        | 10.0% |   |
| E.L.N.               | 54.0% |   |

| Indicaciones de uso   |
|---|
| Alimento balanceado medicado con oxitetraciclina para cerdas en gestación. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado su uso de 8 a 10 días para el tratamiento de neumonía enzoótica, leptospirosis y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina. Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas. |

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos

calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

# CARNERINA NO. 5 GESTACION

## API ABA OXITETRACICLINA

### 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

