



CONCENTRADO INICIADOR

Concentrado proteico medicado con Carbadox para mezclarse con granos para
alimentación de cerdos **Autorización SAGARPA A-0544-502**

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 36%	Pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, aceite vegetal, suero de leche deshidratado bovino o lactosa bovino, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, óxido de cromo, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina o metionina o treonina o triptófano) acidificantes orgánicos e inorgánicos (ácido butírico, málico, fumárico, cítrico, ortofosfónico), levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> bouliardii (6×10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa 2000 FTU/kg, xilanasa 4800 U/kg, β glucanasa 800 U/kg, celulasa 800, manasa 7200 U/kg) saborizante lácteo o frutal o aromatizante lácteo frutal sintéticos, Carbadox (100g/t) y dará 32 g/t de Carbadox en el alimento terminado.
Grasa, mín. 3.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 8.0%	
Cenizas, máx. 20.0%	
E.L.N., mín. 21.0%	

Indicaciones de uso		
Concentrado proteico medicado con carbadox para mezclarse con granos molidos para alimentación de cerdos en iniciación (20 a 35 kg de peso). Indicado para tratamiento de disentería porcina, la salmonelosis y la colibacilosis		
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral. El alimento terminado proporcionará a libre acceso en toda la etapa indicada.		
Recomendaciones generales de uso para elaborar 1 tonelada de alimento terminado:		
Etapa productiva	CONCENTRADO INICIADOR (D41)	GRANOS MOLIDOS
INICIACION (20 A 35 kg)	320kg (32%)	680kg (68%)

ADVERTENCIAS:

No use en cerdos de mas de 40 kg de peso corporal. Prohibido el uso para todos los Porcinos adultos y para todas las edades de las demás especies animales destinadas para consumo humano.
No usar en la alimentación de rumiantes. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.
Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.
No usar en alimentación de rumiantes.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CONCENTRADO INICIADOR



D41 FECHA DE PRODUCCION

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"