## MX011996



## CARNERINA NO. 2 API ABA ORTETRACICLINA Y MULINA 20KG PE

Alimento balanceado medicado con clorhidrato de clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para crecimiento de cerdos.

## Autorización SAGARPA A-0544-504

Análisis garant	tizado
Proteína, mín.	16.0%
Grasa, mín.	3.0%
Humedad, máx	12.0%
Fibra, máx.	5.0%
Cenizas, máx.	8.0%
FIN	56.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (fisina, metionina treonina, triptofano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xtanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante frutal sintético, clorhidrato de clortetraciclina 56.0% (300 g/ton), furnarato hidrogenado de tiamulina (100 g/ton).

## Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad)

Presentación en pellet que ayuda a consumirio adecuadamente.

formulado y elaborado con ingredientes de calidad que proveen los nutrimentos necesarios

Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzootica, pleuroneumonía, rinitis atrófica, enfermedad de Glasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea post-destate, enteritis no específica, enteritis necrótica) problemas reproductivos (leptospirosis).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral, Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: No se debe administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 2 API ABA CLORTETRACICLINA Y TIAMULINA 20KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

ECHA DE PRODUCCION

