Contenido Neto: 25 l

867100XM

POLLO INICACION

880-880-A A98ADA2 noisezitotuA

PARA AVES DE ENGORDA EN LA ETAPA DE INICACION PREMEZCLA MINERAL MEDICADA CON SALINOMICINA

OGASITNARAÐ SISIJANA

% 00'ZT "UWA Calcio

NGREDIENTES:		
% 00°SZ	XEW.	Centras
% 00'L	Max	Humedad
% 00°b	Wax.	Fibra cruda
% 00'5	.niiv	osolzó?

INDICACIONES: phidoxina, monontrato de tiamina, riboflavina, ácido folicom cianocobalamina, vehiculo vegetal. satioxidante (BHA, Etoxiquin), vitemina A, D3, E, K, biotina, niacina, pentotenato de calcio, ciochildrato de manganoso, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobre, selenito de sodio, carbonato de cobalto, lodo EDDY ,

Premezda mineral medicada con salinomicina para aves de engorda en la etapa de iniclación, de 1 día de nacido

cloruro de colina, salinomicina (1 500 g/ton) fitasa (12 500 FTU/kg), sulfao ferroso, sulfato de manganeso, óxido Carbonato de calcio, ortofosfato monodicálcico, sal común, bicarbonato de sodio, lisina y/o metionina y/o treonina,

importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los polios. , bebe se sememes € sel atzeit γ

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Agregar 40 kg de POLLO INICIACION al resto de los ingredientes para contort una tonelada

de alimento balanceado.

ADVERTENCIAS: sollog sei steg essett y signiff auge ofnernom obot ne tenefnem etnetrogmi-

No almacenar el producto, en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos,

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. protegidos de roedores, insectos y otros animales.

No se debe administrar tiamulina a los pollos que esten recibiendo el producto. Retirar el producto 24 horas antes del sacrificiode los animales destinados para consumo humano. No ofrecer este producto directamente a los animaies.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

Su venta requiere receta médica

Fecha de caducidad : Un año despues de su fecha de producción Lote No: