

MX010745



CARNERINA API ABA FASE 4

40KG SULFA TRIMETOPRIM

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con sulfacioropiridacina sódica y trimetoprim para cerdas lactantes

Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado	
Proteína, mín.	17.0%
Grasa, mín.	6.0%
Humedad, máx.	12.0%
Fibra, máx.	6.0%
Cenizas, máx.	10.0%
E.L.N.	49.0%

Ingredientes
Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/t), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2x10 ⁹ UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanas: 1200 U/kg, β glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), sulfacioropiridacina sódica (560 g/t), trimetoprim (100 g/t).

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con sulfacioropiridacina y trimetoprim para cerdas de lactancia. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas.
Indicado su uso de 5 a 10 días para el control de rinitis atrófica, complejo MMA, diarreas bacterianas bronconeumonías, neumonía enzootica, enterotoxemia y colibacilosis.
Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales y del número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: 3 días previos al sacrificio destinado a consumo humano. No administrar en aves de postura.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 4

40KG SULFA TRIMETOPRIM

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

