

MX012174



GROWPIG! DESARROLLO CLORTETRACICLINA Y TIAMULINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	15.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido y/o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas 3 kg/t, saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xilanasa 1200 U/kg, β glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), clorhidrato de clortetraciclina (300 g/t), fumarato hidrogenado de tiamulina (100 g/t).
Grasa, mín.	4.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	3.0%	
Cenizas, máx.	6.0%	
E.L.N.	60.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina; formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg). Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzootica, pleuroneumonía, rinitis atrófica, enfermedad de Glasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea post-destete, enteritis no específica, enteritis necrótica), problemas reproductivos (leptospirosis). Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario. ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Tiempo de retiro: No se debe administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO CLORTETRACICLINA Y TIAMULINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

