

MX00072

VIPREWEAN FASE 2 A TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

Autorización SAGARPA A-9066-003

ALIMENTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

USO VETERINARIO

ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda	Mín.	20,50%
Grasa cruda	Mín.	4,50%
Fibra cruda	Máx.	3,00%
Humedad	Máx.	12,00%
Cenizas	Máx.	7,50%
E.L.N	Dif.	53,50%

INGREDIENTES:

Sorgo, maíz, pasta de soja, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, harina de pescado y/o harina de sementa de origen porcino, azúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. subtilis* (9,9 x 10⁸ UFC/kg), cloruro de colina, fitasa (2 000 FYT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiamulina (100 g/ton), clortetraciclina (300 g/ton), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, todo EDDV y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina.

INDICACIONES:

Alimento medicado con tiamulina y clortetraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0 kg de peso). Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y clortetraciclina.

Importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE 2 a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 días.

ADVERTENCIAS:

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos. Proteja los productos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano. No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"