

## BECERRO ENGORDA 16% MEDICADO CON CLORTETRACICLINA API ABA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con Clortetraciclina para ganado bovino de engorda

## Autorización SAGARPA A-0544-823

## Análisis garantizado Proteína, mín. 16.0%

Grasa, mín. 2.0% Humedad. máx. 12.0%

Fibra, máx. 14.0%

Cenizas, máx. 18.0%

E.L.N. 38.0%

Ingredientes

Granos de cereales (maiz o sorgo o trigo), subproductos de cereales (salvado de trigo, salvado de maiz, pulido de arroz, cascarillas), pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), nitrógeno no proteico (máximo 2% urea), clortetraciclina 300g/t.

Indicaciones de uso

Alimento BECERRO ENGORDA 16% es un alimento medicado con clortetraciclina para el tratamiento de infecciones causadas por las bacterias. Gram (+) Gram (-) que afectan a los bovinos productores de carne. Está diseñado, formulado y elaborado con ingrecientes que cumplen nuestros estándares de calidad, adecuado para complementar la alimentación de ganado bovino de engorda que principalmente se tiene en condiciones de pastoreo de forrajes de mala a regular calidad, alimentados con rastrojos, pajas y otros subproductos agricolas y agroindustriales y/c complementados también con granos disponibles. Contiene clorietraciclina para el tratamiento de enfermedades como Pasteurelosis (fiebre de embarque), pododermatitis, septicemias, anaplasmosis y diarreas bacterianas y prevención de abscessos hepáticos.

Para mayor información del uso de este producto, favor de contactar a su distribuidor o al asesor pecuario de maltaCleyton®.

Mantener en todo momento agua limpia y fresca para su ganado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Dosis de 10 a 20 mg/kg de peso vivo; vía oral. Tratamiento de 7 - 10 días.

Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS

No almacene el altimento en lugares húmedos, calientes y mal ventiliados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. La administración conjunta con vitaminas minerales durante un tiempo prolongado no se recomienda. Este altimento no debe suministrarse a bovinos productores de leche para consumo humano. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contaco con paredes. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase de animales. Dé Salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.

PERIODO DE RETIRO:

Para sacrificio de bovinos destinados a consumo humano debe esperar 1 día posterior al tiltimo consumo del alimento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIRE RECETA MÉDICA

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

BECERRO ENGORDA 16% MEDICADO CON CLORTETRACICLINA API ABA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"