MX010723



CARNERINA API ABA FASE 2 40KG TILMICOSINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilmicosina para crecimiento de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-504

Análisis garantizado Proteina, min. 16.0% Grasa, mín. 3.0% Humedad, máx, 12,0% Fibra, máx. 5.0% Cenizas, máx. 8.0%

56.0%

E.L.N.

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zino, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico vitaminas A, D, E y K estabilizadas vitaminas del complejo B, aminoácidos (lisina, metionina treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), ácido propiónico y ácido acético como fungicida enzimas deshidratadas. (fitasa: 500 FTU/kg., xilanasa: 1200 U/kg., β glucanasa 200 U/kg., celulasa: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante frutal o aromatizante frutal sintético,

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con tilmicosina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad) Presentación en pellet que ayuda a consumirio adecuadamente.

fosfato de tilmicosina (200 g/ton)

Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales,

vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa

Indicado para el tratamiento de neumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae

Mycoplasma hyopneumoniae. Pasteurella multocida y otros microorganismos sensibles a tilmicosina; en enfermedad de Glasser; y para reducir los signos clínicos y mortalidad

asociada al Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRSS) Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral, Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro: Este alimento deberá de ser retirado de los cerdos destinados para consumo humano 7 días antes del sacrificio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 2 40KG TILMICOSINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

ECHA DE PRODUCCION