"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

o meses después de su fecha de producción Fecha de caducidad:

Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

'ousmund

Lote No:

omuznos la siaq nantaeb as aup zobras zof ab olofficiae lab santae salb 85 otouborq etae antzinimba as oM Estibar sobre tarimas y munca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

protegidos de roedores, insectos y otros animales. No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos.

ADVERTENCIAS:

'selb (A 2

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE 3 a libre acceso bajo la primicia de poco y trecuente durante

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

sonibriog soli sted easertly signal augs of camorn obot ne renetnem etnistrogmi indicado para el tratamiento de infecciones sensibles a la combinación de florfenicol y tilosina. Alimento medicado con tilosina y florfentcol para cerdos en la etapa de preiniciación (de 12 a 15 kg de peso).

INDICACIONES:

cianocobalamina.

viteminas A, D3, E, K, biotina, niscina, pantotenato de calcío, mononitrato de tiamina, ribollavina, ácido fólico, cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, íodo EDDY y/o yoduro de potasio, inhibidor de hongos, tilosina (110 g/ton), flortenicoi (40 g/ton), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), écidos orgánicos, ácido propionico como combinación de Bacillus licheniformis y 8 Subbilis (9.9 x10/8) UFC/kg), cioruro de colina, fitasa (2 000 FYT/kg). itsina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura Saccharomyces cerevisiae inactiva, harina de sangre de origen porcino, azúcar, carbonato de calcío, ortofosfato monodicálcico, sal común, bentonita Sorgo, maiz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, acelte vegetal, harina de pescado y/o

INCREDIENTES:

847000XM

| %05'\$S | DIE. | N'3'3 |
|---------|--------|----------------|
| %05'L | X5N | Sezjuao |
| %00'ZI | X6AX. | рерэціпн |
| %05'E | V\$9x° | Fibra cruda |
| %05'E | .niM | Grass cruda |
| %00'6T | Min | Proteina cruda |

ODAZITNARAÐ SISIJANA

USO VETERINARIO

ALIMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLORFENICOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN Autorización A98ADA2 nóisasirosuA

VIPREWEAN FASE 3

Contenido Neto: 40k