

**MX000742**

Contenido Neto: 40kg

VIPREWEAN FASE 2 A TIAMULINA Y CLORETRACICLINA 40KG PE

Autorización SAGARPA A-9066-003

AUMENTO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORETRACICLINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

**ANÁLISIS GARANTIZADO**

Proteína cruda	Mín.	19,50%
Grasa cruda	Mín.	4,50%
Fibra cruda	Max.	3,00%
Humedad	Máx.	12,00%
Cenizas	Máx.	7,50%
E.L.N	Dif	53,50%

**INGREDIENTES:**

Sorgo, maíz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, harina de pescado y/o harina de sementa de origen porcino, azúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. subtilis* (9,9 x 10<sup>8</sup> UFC/kg), cloruro de colina, fitasa (2 000 FYT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiamulina (100 g/ton), clortetraciclina (300 g/ton), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, todo EDDV y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina.

**INDICACIONES:**

Alimento medicado con tiamulina y clortetraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 8 a 12 kg de peso). Indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y clortetraciclina. Importante y vital en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:**

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE 2 a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 días.

**ADVERTENCIAS:**

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos. Protegidos de roedores, insectos y otros animales. Evitar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano. No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**  
**Su venta requiere receta médica**

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

**"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"**