## CAPORINA FINALIZADOR **API ABA SALINOMICINA 40KG M3**

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

#### Autorización SAGARPA A-0544-615

### Análisis Garantizado

Proteina, min. 190% 3.5% Grasa, min.

Humedad, máx. 12.0%

Fibra, máx. 3.0% 7.0% Cenizas, máx.

55.5% E.L.N.

#### Ingredientes

Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio. levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10^9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (iodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, o xilanasa: 1200 U/kg, ß glucanasa: 200

U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carolenoides naturales.

Salinomicina 60g/t.

### Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda desde el día 36 de edad iasta el mercado. Indicado en el tratamiento y control de coccidias en aves (E. acervulina, E. máxima E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. brunetti) y para el tratamiento de infecciones causadas ior bacterias Grampositivas y bacterias anaerobicas como Clostridium perfringens.

CAPORINA FINALIZADOR es un alimento completo, tiene 19% de proteína, la cantidad de energía y los actores naturales de pigmentación que requieren los pollos para su finalización. En programas con ilimentación restringida y ciclo de engorda mayor a 49 días, se proporciona del día 36 de edad hasta u salida al mercado. En zonas con ciclos menores a 42 días proporcionar a partir de los 29 días hasta al mercado.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso vía oral, desde el día 36 de edad hasta su salida al nercado

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en pavos ni equinos. No agregar o mezclar con otros fármacos i otro antibiótico. No se administre a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano lo almacenar el alimento en lugares húmedos calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento lirectamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



# CAPORINA FINALIZADOR API ABA SALINOMICINA 40KG M3