"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

677000XM

Contenido Neto: 25kg

VIPREWEAN FASE O A TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA 25KG PE

200-3309-A A9AAAA noissiiotuA

USO VETERINARIO NO MEDICADO CON TIAMULINA Y CLORTETRACICLINA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACION

ción de Bacillus licheniformis y B. Subtilis (9.9 x 10/8 UFC/kg) metionina y/o treonina y/o triptofano, cultivo de levadura narina de sangre de origen porcino, carbonato de calcio, ortofosfato o isctosa de orige bovino, aceite vegetal, proteina concentrada de

%08'Z Fibra cruda A:BX 960019 'UIA Grass cruda %00'77 UIA Proteina cruda **ODAZITNARAÐ SISIJANA**

%0L'6b DIF. N.J.3

fitasa (2 000 FYT/kg) cloruro de colina, betaina, saborizante sintético sabor frambuesa, ácidos orgánicos
Saccharomyces cerevisiae inactive, combinación de Bacillus licheniformis y B. Subtilis (9.9 x 10% UFC/kg)
monodicálcico, caotin, sal común, fisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano, cultivo de levadura
soya, harina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, carbonato de calcio, orto
Sorgo, maiz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de orige bovino, acelte vegetal, proteina concentra
INGREDIENTES:

KEN!

ASK.

%05'8 %00'ZI

INDICACIONES E, K, błotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina.

Cenizas

рерэшин

*SAIDNERTENCIAS:

digestivas susceptibles a la combinación de tiamulina y ciortetracicina. vida y haste que elcance los 6,0kg de peso). Indicado en el tratemiento de enfermedades respiratorias y dimento medicado con tramulina y clorretraciclina para cerdos en la etapa de preiniciación (del IS" de de

y/o sulfato de zinc, sulfato de mengeneso, selenito de sodio, iodo EDDY y/o yoduro de potesio, vitaminas A, D3, ciortetraciciina (300 g/ton) carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido entioxidente (SHA Etoxiquin), ácido propiónico como inhibidor de hongos, tiemuline (100 g/ton),

sonicron entended and control of the second of the second

Oral, ofrecer el altimento VIPEREWEAM FASE O a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

.zeib 7

, referins ento y enfoech (serobeon eb soblgetorq No almacenar el altmento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sittos secos y frescos.

"อนะเนกน otunsuos je eled ueugsep es enbisopieo soj epiojojuoes jep setue sejpig otonpold etse elitiquipe es ojy Estipat copie tatimas y nuica dejat el producto directamente sobre el suelo y/o en consecto con paredes.

Asonicade la silmento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción : oN efol