MX012045



CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA CLORTETRACICLINA Y TIAMULINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con clorhidrato de clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado
Proteína, mín. 13.0%
Grasa, mín. 4.0%
Humedad, máx. 12.0%
Fibra, máx. 7.0%
Cenizas, máx. 10.0%
E.L.N. 54.0%

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobello, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenito orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (1x10º9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, o xilanasa 1200 U/kg), clorhidrato de cloretraciclina (300 g/fon), fumarato hidrogenado de tiamulina (100 g/fon).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina para cerdas en gestación. Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas , granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzoótica,

Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzoótica, pleuroneumonía, rinitis atrófica, enfermedad de Giasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea, post-destete, enteritis no específica, enteritis necrótica) problemas reproductivos (leptospirosis).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/d/a. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No se debe administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA CLORTETRACICLINA Y TIAMULINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"