MX010681



GROWPIG! DESARROLLO 40KG CLORTETRACICLINA IAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado Proteina, min. 15.0% Grasa, mín. 4.0% Humedad, máx.12.0% Fibra, máx. 3.0% Cenizas, máx. 6.0% E.L.N. 60.0%

Ingredientes Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido y/o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenio orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos como secuestrante de micotoxinas 3 kg/t, saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propiónico y ácido acético como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xitanasa 1200 U/kg, ß glucanasa 200 U/kg, celulasa 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), ciorhidrato de clortetraciclina (300 g/t), fumarato hidrogenado de de tiamulina (100 g/t).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina; formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg). Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzoótica, pleuroneumonfa, rinitis atrófica, enfermedad de Glasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea post-destete, enteritis no específica, enteritis necrótica), problemas reproductivos (leptospirosis).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso, vía cral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

Tiempo de retiro. No se debe administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO 40KG CLORTETRACICLINA TIAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"

