

Contenido neto: 40 kg

CC



# CAPORINA CONCENTRADO

Alimento Concentrado Medicado con Salinomycin para pollos de engorda

Autorización SAGARPA

A-0544-856

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	38.5%	Pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina), enzimas deshidratadas (fitasas 2000 FTU/kg) minerales orgánicos (hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, 114 g de salinomycin/tonelada de producto terminado (12% para obtener 60 g/l en el producto final).
Grasa, mín.	2.5%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	8.0%	
Cenizas, máx.	13.0%	
E.L.N., mín.	26.0%	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

Indicaciones de uso			
CAPORINA CONCENTRADO es un alimento concentrado, medicado con Salinomycin, para pollo de engorda, diseñado, formulado y elaborado para ser mezclado con una fuente de grano y aceite crudo de soya o canola, según sea la necesidad, para la elaboración de un alimento completo para satisfacer las necesidades del pollo de engorda. Para el tratamiento y control de coccidias en pollo de engorda (Eimeria máxima, E. acervulina, E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. brunetti).			
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Vía Oral.			
Producto para ser mezclado con granos molidos (sorgo, maíz o combinación de estos) y obtener un alimento completo para pollo de engorda.			
Recomendaciones generales para elaborar una tonelada de alimento terminado:			
EDAD DEL POLLO DE ENGORDA	CAPORINA CONCENTRADO KG	Maíz y/o sorgo o combinación	Aceite de soya y/o canola kg
0 a 21 días	530	470	0
22 días a dejar de administrar	530	430	40
Hacer la mezcla procurando que sea homogénea y en las cantidades sugeridas.			
ADVERTENCIAS: No ofrecer este alimento concentrado sin antes mezclarlo, conservarse a temperatura ambiente a no más de 30°C, en un lugar seco. No se deje al alcance de los niños, NO administrar a equinos, No administrar en pavos, ni pollas de reemplazo mayores a las 14 semanas de edad o ponedoras en producción, No utilizar otros fármacos anticoccidiales simultáneamente en el alimento. No usar en conjunto con tiamulina o troleandomicina, no se administre este producto a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano. Suspender su administración a los animales destinados al consumo humano 5 días antes del sacrificio.			

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

## CAPORINA CONCENTRADO



FECHA DE PRODUCCION

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"