

MX010749



# CARNERINA API ABA FASE 5 40KG AMOXICILINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con amoxicilina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	13.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ( $2 \times 10^9$ UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., $\alpha$ -amilasa 1200 U/kg., $\beta$ -glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), amoxicilina (400 g/ton)
Grasa, mín.	4.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	7.0%	
Cenizas, máx.	10.0%	
E.L.N.	54.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con amoxicilina para cerdas en gestación Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas. Indicado su uso 7 días para el tratamiento de infecciones bacterianas tales como estreptococosis, pleuroneumonía contagiosa, poliserositis infecciosa, nefritis, cistitis e infecciones del tracto reproductivo. Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: 14 días. No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 14 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

## CARNERINA API ABA FASE 5 40KG AMOXICILINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

