MX010754



CARNERINA API ABA FASE 5 40KG TILOSINA SULFAMETAZINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con fosfato de tilosina y sulfametazina para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado
Proteína, mín. 13.0%
Grasa, mín. 4.0%
Humedad, máx. 12.0%
Fibra, máx. 7.0%
Cenizas, máx. 10.0%

54.0%

E.L.N.

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, meiaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato o orgánico, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio e EDDI, selenio orgánico, como orgánico, otiaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de cofina, aminoácidos (ilsina, metionina, treonina, triptófano), saborizante aminoácidos (ilsina, metionina, treonina, triptófano), saborizante caromátizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10°9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg.) o xilanasa (250 U/kg.), fisitato de tilosina (110 g/ton), sulfametazina (110 g/ton), sulfametazina (110 g/ton).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con tilosina y sulfametazina para cerdas en gestación. Presentación en pellel que ayuda a consumirio adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado para reducir la incidencia y severidad de rinitis por Bordetella bronchiséptica; para la prevención de la disentería porcina entertits bacteriana porcina(salmonelosis) o enteritis necrótica causada por salmonella choleraesuis; control de neumonía porcina causada por pasteurella multiocida y/o Actinomyces pyogenes.

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.


DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/d/a. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los alimentos destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



CARNERINA API ABA FASE 5 40KG TILOSINA SULFAMETAZINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"