

MX010757



# CARNERINA API ABA FASE 5 40KG CLORTETRACICLINA TIAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con clorhidrato de clortetraciclina y fumarato hidrogenado de tiamulina para cerdas en gestación

**Autorización SAGARPA A-0544-507**

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 13.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ( $1 \times 10^9$ UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., $\alpha$ -amilasa 1200 U/kg., $\beta$ -glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), clorhidrato de clortetraciclina (300 g/ton), fumarato hidrogenado de tiamulina (100 g/ton).
Grasa, mín. 4.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 7.0%	
Cenizas, máx. 10.0%	
E.L.N. 54.0%	

## Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con clortetraciclina y tiamulina para cerdas en gestación.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado su uso 7 días para el tratamiento de problemas respiratorios (neumonía enzootica, pleuroneumonía, rinitis atrofica, enfermedad de Glasser, estreptococosis), problemas digestivos (disentería, ileitis, diarrea, post-detele, enteritis no específica, enteritis necrótica) problemas reproductivos (leptospirosis).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario

**ADVERTENCIAS:** Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No se debe administrar 7 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

# CARNERINA API ABA FASE 5 40KG CLORTETRACICLINA TIAMULINA CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

