MX012002



CARNERINA NO. 2 API ABA INCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para crecimiento de cerdos.

Autorización SAGARPA A-0544-504

Análisis garantizado	
Proteína, min.	16.0%
Grasa, mín.	3.0%
Humedad, máx	12.0%
Fibra, máx.	5.0%
Cenizas, máx.	8.0%
E.L.N.	56.0%

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobato, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cormo orgánico, vitaminas A. D. E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, aminoácidos (fisina, metionina treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 kg/l), ácido propiónico y ácido acetico como fungicida, enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg, xitanasa 1200 U/kg, g glucanasa 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante frutal sintetico, lincomicina (100 g/l), clortetraciclina (400(g/t)).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con fincomicina y clortetraciclina para crecimiento de cerdos (42 a 77 días de edad)

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cerelaes procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan tos nutrientes necesarios para esta etapa.

Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por Mycoplasma spp y Actinobacillus pleuropneumoniae (App), y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas Porcinas (EPP) Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No destinar para consumo humano la came de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 2 API ABA LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

FECHA DE PRODUCCION