MX012172



GROWPIG! DESARROLLO LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina para desarrollo de cerdos

Autorización SAGARPA A-0544-674

Análisis garantizado	
Proteína, min.	15.0%
Grasa, mín.	4.0%
Humedad, máx	.12.0%
Fibra, máx.	3.0%
Cenizas, máx.	6.0%
E.L.N.	60.0%

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, melaza de caña, aceite vegetal, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, oxido y/o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de cobato, carbonato y/o sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de cobato, carbonato y/o sulfato ferroso, yoduro de potasio y/o EDDI, cromo orgánico, selenito orgánico, vitaminas (A, D, E, K, C, del complejo B), cloruro de cofina, aminoácidos (lisina, metonina, trabrefano), aluminositicatos como secuestrante de micotoxinas (3 kg/t), saborizante frutal o aromatizante frutal sintéticos, ácido propionico y ácido acético como lungicida, enzimas deshidratadas (filasa 500 FTU/kg, xianasa 1200 U/kg, g glucanasa 220 U/kg, manasa 1800 U/kg), lincomicina (190 g/t), cofetrareicilina (400 g/t), cofet

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con fincomicina y clortetraciclina; formulado y elaborado con proteinas granos de cereales procesados , minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrimentos esenciales para el desarrollo de los cerdos (peso vivo entre 50 y 75 kg.).

Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por Mycoplasma sop y Actinobacillus pleuropneumoniae (App), y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas Porcinas (EPP).

Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso, vía oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mai ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No se debe de administrar 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GROWPIG! DESARROLLO LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"