

MX010753

Contenido neto:



# CARNERINA API ABA FASE 5 40KG FLORFERNICOL TILOSINA AMBROXOL CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol para cerdas en gestación

**Autorización SAGARPA A-0544-507**

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 13.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ( $2 \times 10^9$ UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg., $\alpha$ -amilasa 1200 U/kg., $\beta$ -glucanasa 200 U/kg., celulasa 200 U/kg., manasa 1800 U/kg.), florfenicol (40 g/ton), tartrato de tilosina (110 g/ton), clorhidrato de ambroxol (4 g/ton)
Grasa, mín. 4.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 7.0%	
Cenizas, máx. 10.0%	
E.L.N. 54.0%	

## Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con florfenicol, tilosina y ambroxol para cerdas en gestación.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado su uso de 10 a 15 días para el tratamiento del complejo respiratorio porcino y otras infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y de la piel, colibacilosis e ileitis proliferativa. Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

**DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

**ADVERTENCIAS:** Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales.

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No utilizar este producto 13 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



# CARNERINA API ABA FASE 5 40KG FLORFERNICOL TILOSINA AMBROXOL CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

D05 FECHA DE PRODUCCION