Contenido Neto: 25kg

8£7000XM

VIPREWEAN FASE 1 B AMOXICILINA 25KG PE

Autorización SAGARA A-9066-002

USO VETERINARIO ALIMENTO MEDICADO CON AMOXICIENA PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACION

%05'0Z OGASITNARAÐ SISIJANA

	.53	PATINADADAM	
%00'75	DIE.	N'7'3	
%00'8	,xelVi	SezineO	
%00'ZI	XE'A	hebamuH	
%00°E	ABK.	Fibra cruda	
%05'b	Will.	Grass cruda	
NOC'OZ	15.55160	DODEST PROPERTY	

nenimeledoconeto collóf obice, eniveltadin cenimeit eb atentinonom sodio, ìodo EDDY y/o yoduro de potasio, viteminas A, D3, E, X, biotina, niacina pantotenato da caicio, carbonato y/o sultato ferroso, suffato de cobre, óxido y/o sultato de zinc, sultato de manganeso, selenito de entioxidente (BHA, Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propiónico como inhibidor de hongos, emoxiciline (400 g/ton), B. Subtilis (9.9 x 10°8 UFC/kg), clorum de colina, fitasa (2 000 FYT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, giuramico, cultivo de levadura Saccharomycas carevistae inactiva, combinación de Bacillus tichaniformis y ortofosfato monodicálcico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o glutamina y/o ácido sove, herina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, asúcer, cerbonato de calcio, Sorgo, mais, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteina concentrada de

INDICACIONES:

importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos enfilizione el e saiditgeasus seneirataed zanolacatri de otratmetari la y nòtanavarq el areq obsolbri Altmento medicado con amoxicilina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0, kg de peso).

Oral, ofrecer el altonento VIRREWEAN FASE La libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

.zeib 7

, selemine sorto y sofoesni, lesechos de soblegetore, No almacenar el altmento en lugares húmedos, callentes y mai ventilados, hágalo en sittos secos y frescos. **ADVERTENCIAS:**

,อกธาสมกั amusnos la eneq nenitrab as aup sobres sol ab distinces lab safre selb 11 otouborg atsa antifurbe as off Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

tio ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

Su venta requiere receta médica CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

: oM stol

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

Lecha de caducidad: 6 meses después de su fecha de producción