

MX000092

Contenido neto:



GALLO DE ORO SUPER BABY SALINOMICINA 5KG ME

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollitos de pelea

Autorización SAGARPA A-0544-680

Análisis garantizado	
Proteína, mín.	21.0%
Grasa, mín.	3.0%
Humedad, máx.	12.0%
Fibra, máx.	4.0%
Cenizas, máx.	8.0%
E.L.N.	52.0%

Ingredientes
Maíz o sorgo molido, pastas y subproductos de oleaginosas, (soya, cártamo, canola) harina de pescado, gluten de maíz, pulido de arroz, melaza, vitaminas A, D y E, complejo B incluyendo B1, B2, B6 y B12, vitamina K, biotina, niacina, cloruro de colina, pantotenato de calcio, ácido fólico, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, óxido de zinc, sulfato de cobalto, cromo, selenio orgánico extracto seco de levadura y Salinomicina 60 g/t.

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con salinomicina iniciador de las aves de combate que cubre perfectamente la demanda nutricional para su crecimiento y adecuado emplume. Gallo de Oro Superbaby debe ofrecerse a partir de la 5ª semana de edad de los pollos y hasta que estos concluyan la 8ª. semana de edad. Antes de este alimento debe proporcionarse Gallo de Oro Inicio y al iniciar la 9ª semana de edad deberá substituirse por Gallo de Oro Desarrollo. Contiene salinomicina 60 g/ton. Para el tratamiento y control de coccidias en aves (pollo de engorda y pollitas de reemplazo). En el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaerobias como Clostridium perfringens. Con Gallo de Oro Superbaby más un adecuado programa de Medicina Preventiva (vacunación y desparasitación) y manejo, se lograrán aves sanas bien desarrolladas y expresión de su potencial genético. No debe faltar agua potable, limpia y fresca siempre al alcance de los animales.
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Oral y a libre acceso.
ADVERTENCIAS:

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase de animales. Dé salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento. Suspender su administración a los animales destinados al consumo humano 5 días antes del sacrificio. No utilizar otras drogas anticoccidias simultáneamente en el alimento (con excepción de traslape normal debido al cambio anticoccidiano). No administrar a equinos, pavo, ni a gallinas de reemplazo mayores a las 14 semanas de edad o ponedoras en producción. No utilizar la tiamulina o troleandomicina en forma simultanea con la Salinomicina. Prohibido el consumo de aves de combate alimentados con este producto.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GALLO DE ORO SUPER BABY SALINOMICINA 5KG ME



FECHA DE PRODUCCION
C45

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"