Contenido Neto: 40kg

8/TTTOXIA

# ANIJIDIXOMA NOO QQADIGEM OTNEMIJA Autonización Adadak rodssznojua WEAN UP 3 B AMOXICILINA 40KG PE

PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PRE-INICIACIÓN

#### 'UIIA %05'b 'UIIA 18,25% Proteina cruda **ODAZITNARAĐ SISIJANA**

#### %S1'SS NT'3 Welv. 9/05'9 SEZIUAN %0071 Vàax, Humedad XE A %00'E Fibra cruda Grasa Cruda

## INGREDIENTES:

biotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina. oxido y/o sultato de zinc, sultato de manganeso, selenito de sodio,EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas  $A_i$ ,  $BS_i$ ,  $E_i$ ,  $X_i$ antioxidante (BHA, Etoxiquin), ácidas orgánicos, amoxicilina (400g/t), carbonato y/o sulfato ferroso, sulfato de cobre, (2.000 FYT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, edulcorante, extractos vegetales (cúrcumia, alitum, capsicum), monodicálcico, sal común, lisine y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o valina, cloruro de collina, litesa Sorgo, mais pasta de soya, soya integral, acelte vegetal, harina de pescado, carbonato de calcio, ortofosfato

### INDICACIONES:

conford and energial and a second of the more of the second of the secon indicado para la prevención y el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles a la amoxicilina. Allimento medicado con smoxicilina para cerdos en la etapa de preiniciación (de 12 a 15 kg de peso).

## DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el allmento VVEAN UP 3 B a libre acceso bajo la primicia de poco y frecuente durante 7 dias..

: oM stol

ADVERTENCIAS:

protegidos de roedores, insectos y otros enimales. No almacenar el allmento, en lugares húmedos, callentes y mai ventillados, hágalo en sitios secos y frescos,

yo otrecer et etimento a onas especies u ona finalidad zootacnica de los poncinos. construct armunos eneg neatized est eup zobiec sal éb alothica el baz estre est d'abudont este estre est annonn Estipat copie tatimas y nunca dejat el producto directamente el suelo y/o en contacto con paredes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta mèdica

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado" Fecha de caducidad : Seis meses después de su fecha de producción