

MX010740



CARNERINA API ABA FASE 4

40KG OXITETRACICLINA

CLIENTE DIRECTO PE

Alimento balanceado medicado con oxitetraciclina para cerdas lactantes.

Autorización SAGARPA A-0544-506

Análisis garantizado		Ingredientes
Proteína, mín.	17.0%	Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3kg/ton), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2×10^9 UFC/kg), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasas: 1200 U/kg, β -glucanasas: 200 U/kg, celulasas: 200 U/kg, manasa 1800 U/kg), oxitetraciclina(400 g/ton)
Grasa, mín.	6.0%	
Humedad, máx.	12.0%	
Fibra, máx.	6.0%	
Cenizas, máx.	10.0%	
E.L.N.	49.0%	

Indicaciones de uso
Alimento balanceado medicado con oxitetraciclina para cerdas en lactancia
Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la lactancia de las cerdas.
Indicado su uso de 8 a 10 días para el tratamiento de neumonía enzootica, leptospirosis y enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.
Mantener en todo momento agua potable y fresca para las cerdas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: La cantidad de alimento requerido por la cerda lactante, depende de su peso, número de lactancia, de las condiciones ambientales, y de número de lechones que se estén alimentando. Oral. Ofrecerlo al menos en 2 a 4 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario.

ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo o en contacto con paredes.

Tiempo de retiro: No debe destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA API ABA FASE 4

40KG OXITETRACICLINA

CLIENTE DIRECTO PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

