

MX010714

Contenido neto: 40 kg



CARNERINA NO.1 REFORZADA API ABA FLORFENICOL, TILOSINA Y AMBROXOL 40KG PE CD

Alimento balanceado medicado con florfenicol, tartrato de tilosina y clorhidrato de ambroxol para iniciación de cerdos **Autorización SAGARPA A-0544-486**

| Análisis garantizado | | Ingredientes |
|----------------------|-------|---|
| Proteína, mín. | 18% | Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, harina de pescado, aceite vegetal, suero de leche deshidratado de bovino o lactosa de bovino, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, óxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido o sulfato de zinc, sulfato de cobalto, carbonato o sulfato ferroso, yoduro de potasio o EDDI, selenio orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano) aluminosilicatos y arcillas como secuestrante de micotoxinas (3 Kg/ton), acidificante orgánico (ácido butírico), ácido propiónico y ácido acético como fungicida, levaduras deshidratadas <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (2×10^9 UFC/kg.), enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg., xilanasas: 1200 U/kg., β glucanasas: 200 U/kg., celulasas: 200 U/kg., manasa: 1800 U/kg.), saborizante o aromatizante lácteo frutal sintético, florfenicol (40 g/ton), tartrato de tilosina (110g/ton)clorhidrato de ambroxol (4g/ton) |
| Grasa, mín. | 4.0% | |
| Humedad, máx. | 12.0% | |
| Fibra, máx. | 4.0% | |
| Cenizas, máx. | 8.0% | |
| E.L.N., mín. | 54.0% | |

| Indicaciones de uso |
|--|
| Alimento balanceado medicado con florfenicol, tilosina y ambroxol para iniciación de cerdos (15 a 42 días de edad) Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas, granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para esta etapa. Indicado su uso de 10 a 15 días para el tratamiento del complejo respiratorio porcino y otras infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y de la piel, colibacilosis e ileitis proliferativa. Mantener en todo momento agua potable y fresca para los cerdos. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar a libre acceso. Oral. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario. |

ADVERTENCIAS:

Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.
Tiempo de retiro: No utilizar este producto 13 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO.1 REFORZADA API ABA FLORFENICOL, TILOSINA Y AMBROXOL 40KG PE CD

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"



D01

FECHA DE PRODUCCION