MX000437



POLLO FINALIZADOR MALTA SALINOMICINA 40KG M3

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-616

| Análisis Garantizado | | Ingredientes |
|----------------------|-------|---|
| Proteína, mín. | 19.0% | Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, |
| Grasa, min. | 3.5% | I the second of |
| Humedad, máx. | 12.0% | D, E, K, B-1, B-2,B-6, B-12, niacina, ácido partoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (lodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, |
| Fibra, máx. | 3.0% | |
| Cenizas, máx. | 7.0% | glucanasa: 200 U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides |
| E.L.N. | 55.5% | naturales. Salinomicina 60 o/t |

Indicaciones de uso

Nimento balanceado medicado con Salinomicina para pollos de engorda desde el día 36 de edad hasta il mercado. Indicado en el tratamiento y control de coccidias en aves (E. acervulina, E. máxima, E. tenella, E. máxima, E. máxima, E. tenella, E. máxima para el tratamiento de infecciones ausadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaeróbicas como Clostridium perfringens. POLLO FINALIZADOR es un alimento completo, tiene 19% de proteina, la cantidad de energía y los actores naturales de pigmentación que requieren los pollos para su finalización. En programas con ilimentación restringida y ciclo de engorda mayor a 49 días, se proporciona del día 36 de edad hasta su aidid al mercado. En zonas con ciclos menores a 42 días proporcionar a partir de los 29 días hasta el nercado.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso via oral, desde el día 36 de edad hasta su salida al nercado.

ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en pavos ni equinos. No agregar o mezciar con otros fármacos i otro antibiótico. No se administre a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano, lo almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y inotegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes

De salida al alimento que tenga mas tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO. SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



A13 F

POLLO FINALIZADOR MALTA SALINOMICINA 40KG M3