

MX000741

Contenido Neto: 25kg

VIPREWEAN FASE 1 F TILOSINA Y FLORFENICOL 25KG PE

Autorización SAGARPA A-9066-002

ALIMENTO MEDICADO CON TILOSINA Y FLORFENICOL PARA PORCINOS EN LA ETAPA DE PREINICIACIÓN

USO VETERINARIO

ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda	Mín.	20,50%
Grasa cruda	Mín.	4,50%
Fibra cruda	Máx.	3,00%
Humedad	Máx.	12,00%
Cenizas	Máx.	8,00%
E.L.N	Dif.	52,00%

INGREDIENTES:

Soya, maíz, pasta de soya, suero de leche y/o lactosa de origen bovino, aceite vegetal, proteína concentrada de soya, harina de pescado, plasma porcino y/o harina de sangre de origen porcino, azúcar, carbonato de calcio, ortofosfato monodibásico, sal común, lisina y/o metionina y/o treonina y/o triptófano y/o glutamino y/o ácido glutámico, cultivo de levadura *Saccharomyces cerevisiae* inactiva, combinación de *Bacillus licheniformis* y *B. subtilis* (9.9×10^8 UFC/kg), cloruro de colina, fitasa (2 000 FVT/kg), saborizante sintético sabor frambuesa, antioxidante (BHA, Etoxiquin), ácidos orgánicos, ácido propiónico como inhibidor de hongos, tilosina(110 g/ton), florfenicol (40 g/ton), carbonato y/o sulfato de hierro, sulfato de cobre, óxido y/o sulfato de zinc, sulfato de manganeso, selenio de sodio, todo EDDY y/o yoduro de potasio, vitaminas A, D3, E, K, biotina, niacina, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, clancobalamina.

INDICACIONES:

Alimento medicado con tilosina y florfenicol para cerdos en la etapa de preiniciación (de 6,0 a 8,0 kg de peso). Indicado para el tratamiento de infecciones sensibles a la combinación de florfenicol y tilosina. Importante mantener en todo momento agua limpia y fresca para los porcinos.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Oral, ofrecer el alimento VIPREWEAN FASE 1 a libre acceso bajo la pinita de poco y frecuente durante 5 A 7 días.

ADVERTENCIAS:

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y frescos, protegerlos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el producto directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. No se administre este producto 28 días antes del sacrificio de los cerdos que se destinan para el consumo humano. No ofrecer el alimento a otras especies u otra finalidad zootécnica de los porcinos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
Su venta requiere receta médica

Lote No :

Fecha de caducidad : 6 meses después de su fecha de producción

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"