

CAPORINA CRECIMIENTO PI ABA ROBENIDINA OKG M2

Alimento balanceado medicado con Robenidina para pollos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-613

Análisis garantizado

Proteina, min. 19.0%

Grasa, mín. 3.5%

Humedad, máx. 12.0% Fibra, máx. 3.0%

Cenizas, máx. 7.0%

E.L.N. 55.5% Ingredientes

Maiz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10⁶9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-8, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina, minerales orgánicos (iodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo # 5, enzimas deshidratādas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, β glucanasa: 200

U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales.

Robenidina 33 o/t.

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado para pollos de engorda desde el día 22 hasta los 35 días de edad. CAPORINA CRECIMIENTO es un alimento completo, medicado con Robenidina. Contiene 19% de proteína y fuentes naturales de pigmento

(xantofilas y carotenoides). Proporcionar a partir de los 22 a los 35 días de edad en zonas con alimentación restringida y periodos de engorda mayor a 49 días; y de los 22 hasta los 28 días en programas de alimentación a libre acceso (en zonas con ciclos menores a 42 días).

Está indicado en el tratamiento de la coccidiosis aviar.

Al día 36 de edad sustituya este alimento por CAPORINA FINALIZADOR, suministre aqua limpia y alimento a libertadi

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: Via oral, A libre acceso a partir de los 22 a los 35 días de edad. ADVERTENCIAS: Suspender el tratamiento 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano. No administrar en aves de postura, productora de huevo para plato destinado para consumo humano

No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CAPORINA CRECIMIENTO API ABA ROBENIDINA 40KG M2

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

