

MX000071



GALLO DE ORO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SALINOMICINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para gallos de combate

Autorización SAGARPA A-0544-681

Análisis garantizado	Ingredientes
Proteína, mín. 17.0%	Maíz o sorgo, pastas y subproducto de oleaginosas (soya, cártamo, canola), harinas de pescado, gluten de maíz, pulido de arroz, melaza, vitaminas A, D y E, complejo B incluyendo B1, B2, B5 y B12, vitamina K, biotina, niacina, cloruro de colina, pantotenato de calcio, ácido fólico, fosfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, óxido de zinc, sulfato de cobalto, cromo y selenio orgánico, salinomicina 60 g/t.
Grasa, mín. 3.0%	
Humedad, máx. 12.0%	
Fibra, máx. 6.0%	
Cenizas, máx. 7.0%	
E.L.N. 55.0%	

Indicaciones de uso
<p>Alimento balanceado medicado con Salinomicina para gallos de combate a partir de la 9ª semana de edad. Para el tratamiento y contra de coccidias en aves (pollo de engorda y politas de reemplazo) (E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix, E. praecox, y E. brunetti) y para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaeróbicas como Clostridium perfringens.</p> <p>DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: A libre acceso, vía oral.</p> <p>GALLO DE ORO DESARROLLO se debe suministrar desde la semana 9 de edad y hasta la semana 15 de vida durante este para restringir su consumo de entre 100 – 150 g por día a partir de la semana 16 de edad y hasta que inicien su periodo de preparación y entrenamiento para el combate.</p> <p>No debe faltar agua potable limpia y fresca siempre al alcance de los animales.</p> <p>ADVERTENCIAS:</p> <p>No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. Evite el acceso a sus bodegas a personas extrañas y toda clase de animales. Dé salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.</p> <p>Suspender su administración a los animales destinados al consumo humano 5 días antes del sacrificio.</p> <p>No utilizar otras drogas anticoccidianas simultáneamente en el alimento (con excepción de traslape normal debido al cambio de anticoccidiano). No administrar a equinos, pavo, ni gallinas de reemplazo mayores a las 14 semanas de edad o ponedoras en producción. No utilizar la tiamulina o troleandomicina en forma simultánea con la Salinomicina. Prohibido el consumo de aves de combate alimentados con este producto.</p>

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de producción

GALLO DE ORO DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SALINOMICINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empaque cerrado"

